



Front

<b>Amoxicillin oral suspension BP 250 mg / 5ml</b>
<p><b>Composition:</b> Each 5 ml of reconstituted suspension (approx. 1 teaspoonful) contains: Amoxicillin Trihydrate BP equivalent to Amoxicillin 250 mg Flavour: Capsil cloudifying and Strawberry, Colour: Tartrazine</p> <p><b>Preparation:</b> To obtain 100 ml suspension, gradually add boiled and cooled water to the dry substance upto the ring mark on the bottle &amp; shake.</p> <p><b>Indications:</b> Lower and upper respiratory tract infections, urinary tract infections, skin and soft tissue infections, venereal infections, pelvic infection.</p> <p><b>Contraindications:</b> A history of allergic reaction to any of the penicillins is a contradiction.</p> <p><b>Precautions:</b> As with any potent drug, periodic assessment of renal, hepatic and hematopoietic function should be made during prolonged therapy. The possibility of superinfections with mycotic or bacterial pathogens should be kept in mind during therapy.</p> <p><b>Adverse reactions:</b> Nausea, vomiting and diarrhoea. Erythematous, maculopapulae rashes and urticaria have been reported.</p> <p><b>Dosage / Mode of administration: Oral</b> Adults: enteric fever: 2-4 gm/day in divided doses for 14-21 days. Children: 20-40 mg/kg/day in 3 divided doses. Enteric fever: 50-100 mg/day in 3 divided doses for 14-21 days. In case of overdose: Induce emesis, gastric lavage, general supportive and symptomatic treatment, haemodialysis may be helpful.</p> <p><b>Storage:</b> The dry powder should be stored in a dry place below 25°C. The reconstituted suspension should be kept in a cool, dry place. Once reconstituted, the suspension should be used within one week of reconstitution. Protect from direct sunlight and humidity. Keep out of the reach of children.</p> <p><b>Presentation:</b> Bottle of 100 ml packed in cardboard box including information leaflet.</p>
 Parcela 726, Avenida das Industrias, Machava Maputo-Mozambique

90 x 188mm

Back

<b>Suspensão oral de Amoxicilina BP 250 mg/5 ml</b>
<p><b>Composição:</b> Cada 5 ml de suspensão reconstituída (aproximadamente 1 colher de chá), contém: Amoxicilina Trihidratada BP equivalente a Amoxicilina 250 mg Sabor: Capsil nublado e morango Cor : Tartrazina</p> <p><b>Reconstituição:</b> Para obter 100 ml de suspensão, adicione gradualmente água fervida e arrefecida à substância seca até a marca do anel na garrafa e agite bem.</p> <p><b>Indicações:</b> Infecções do tracto respiratório superior e inferior, infecções do tracto urinário, infecções de pele e tecidos moles, infecções venéreas e infecções pélvicas.</p> <p><b>Contra-indicações:</b> Histórico de reacções alérgicas a qualquer tipo de penicilinas é uma contra-indicação</p> <p><b>Precauções (avisos):</b> Tal como acontece com qualquer droga potente, a avaliação periódica da função renal, hepática e hematopoética deve ser feita durante a terapia prolongada. Deve ser tido sempre em consideração a possibilidade de superinfecções com patógenos micóticos ou bacterianos.</p> <p><b>Reacções adversas:</b> Náuseas, vômitos e Diarrhea. Eritematosas, maculopapulares erupções cutâneas e urticária foram relatadas.</p> <p><b>Dosagem / Modo de administração: Oral</b> Adultos: Febre entérica: 2-4 g / dia em doses divididas durante 14-21 dias. Crianças: 20-40 mg/kg/dia em 3 doses divididas. Febre entérica: 50-100 mg / dia em doses divididas durante 14-21 dias Em caso de Overdose : Induzir emese, lavagem gástrica, tratamento geral de apoio e sintomático, a hemodiálise pode ser útil.</p> <p><b>Conservação:</b> O frasco com pó seco deve ser conservado em lugar fresco e seco a temperatura inferior a 25°C, protegido da luz. Uma vez preparada, a suspensão deve ser usada dentro de uma semana após a reconstituição. Proteger da luz solar direta e da humidade. Manter fora do alcance das crianças.</p> <p><b>Apresentação:</b> Frasco de 100 ml embalado em caixa de cartão incluindo folheto informativo</p>
 Parcela 726, Avenida das Industrias, Machava Maputo-Mozambique

90 x 188mm

## ARTWORK DETAIL LABEL

Product	Amoxicillin oral suspension BP 250mg / 5ml		
Buyer / Country	Mozambique	Component	Leaflet
Dimension	90 x 188mm	Pack	NA
New Item Code	STR/M/PI/003	Old Item code	NA
Colour Shades	██████ BLACK	No. of Colours	1

Change Control No.		Artwork Version	R0	
Design/Style	Front & Back Printing			
Substrate	60 gsm maplitho paper			
Special Instruction	Colours to be matched as per pantone shades only. Printing clarity to be clear and sharp			
Autocartonater Requirement	NA			
Prepared By:	Reviewed By:	Reviewed By:	Reviewed By:	Approved By:
PDC-AW	Mkt/BD	RAD	PD	QA

## FOR ARTWORK REVISION PURPOSE

To be filled by SCM (Planning)	Effective Date :		Sign/ Date:	
--------------------------------	------------------	--	-------------	--

**Caution to the printer:** Before processing please ensure that the ARTWORK received for printing is exactly in line with APPROVED ARTWORK provided to you. In case of any FONTS/DESIGN are Mis - matching with the APPROVED ARTWORK, please inform to PDC for further action. **DO NOT MAKE ANY CHANGE TO THE ARTWORK WITHOUT WRITTEN INSTRUCTION FROM PDC.**

QA/068/F-01/R0