

Front

Chlorphenamine Tablets BP 4mg

Composition: Each uncoated tablet contains: Chlorphenamine maleate BP 4 mg Excipients q.s.

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist nurse has told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse.
- You must talk to your doctor if you do not feel better if you feel worse.

What is in this leaflet:

- What CHLORPHENAMINE Tablets are and what they are used for
- What you need to know before you take CHLORPHENAMINE Tablets
- How to take CHLORPHENAMINE Tablets
- Possible side effects
- How to store CHLORPHENAMINE Tablets
- Contents of the pack and other information

1. What CHLORPHENAMINE Tablets are and what they are used for:
CHLORPHENAMINE belongs to a group of medicines called antihistamines. Histamine is one of the chemicals released in the CHLORPHENAMINE works by blocking the action of histamine. CHLORPHENAMINE is used to relieve the symptoms of allergic conditions such as hayfever (seasonal allergic rhinitis), runny nose (rhinitis), urticaria (also known as "hives"), pruritus (itch), insect bite or sting reactions, allergies to food or medicines. It helps to relieve the symptoms associated with the above conditions such as itchy skin rashes; sneezing; itchy, runny or blocked nose; red, itchy and watering eyes.

2. What you need to know before you take CHLORPHENAMINE Tablets:
If the answer to any of the following questions is YES, DO NOT take this medicine without consulting your doctor:

- Have you previously suffered an allergic reaction to a medicine containing CHLORPHENAMINE or to any of the other ingredients in this medicine (listed in section 6).
- Have you taken a medicine called a Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) to treat depression in the last 14 days?

Warnings and precautions:
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking CHLORPHENAMINE Tablets if any of the following apply to you:

- Very high blood pressure.
- Epilepsy.
- Heart disease, liver disease or kidney disease.
- Glaucoma.
- Enlarged prostate.
- Bronchitis, asthma or bronchiectasis.

Talk to your doctor before taking this medicine if you are taking other medicines containing other antihistamine, including products for the relief of colds and coughs.

Other patient groups:
Children and the elderly are more susceptible to the neurological anticholinergic effects of CHLORPHENAMINE.
This medicine is NOT SUITABLE for any children under 6 years.

Other medicines and CHLORPHENAMINE Tablets:
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. In particular, any of the following:

- Medicines which have a sedative effect (e.g. drugs to help sleeping problems or anxiety as they are likely to increase the sedative effects of CHLORPHENAMINE such as Mono Amine Oxidase Inhibitors (MAOIs).
- The effects of phenytoin (a medicine used to treat epilepsy) may be increased when taken with CHLORPHENAMINE.

Pregnancy and breast-feeding:
If you are pregnant or breast-feeding, think you might be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Warning:
Do not drive or operate machinery if the tablets make you feel drowsy, dizzy or if you experience blurred vision.
Avoid drinking alcohol while taking this medicine.

3. How to take CHLORPHENAMINE Tablets:
Consult a physician before use. For oral use. The tablets should be swallowed with a drink of water. You should take your medicine as directed by your doctor. The pharmacist's label should tell you how much to take and how often.
If it does not or if you are not sure ask your doctor or pharmacist.

The usual doses are as follows:
Adults and the elderly: One tablet (4 mg) every four to six hours (maximum of 6 tablets daily).
Children and adolescents
Children 6-12 years of age: Half a tablet (2 mg) every four to six hours (maximum of 3 tablets daily).
Not recommended for children under 6 years of age.
The dose prescribed by your doctor may be different to the usual dose given above; always follow your doctor's or pharmacist's instructions for taking medicines.

If you have taken more than you should:
If you or anyone else has taken too many tablets you should contact your doctor or nearest hospital casualty department immediately. Do not attempt to drive. Symptoms in children include hallucinations, excitement and convulsions. In adults symptoms include drowsiness, coma and convulsions.

If you forget to take a dose of CHLORPHENAMINE Tablets:
Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

4. Possible side effects:
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Children and older people are more prone to side effects.

- The most common side effects is drowsiness.
- This can be helpful if symptoms are particularly troublesome night.

Stop taking this product and consult your doctor if you:

- Experience allergic reaction which can be severe. Signs include raised and itchy skin swelling of the face or mouth causing difficulty breathing.
- Experience liver problems.
- Experience anaemia or unexplained bleeding or bruising.
- Experience difficulty passing water.
- Collapse.

The following side effects may occur:


- Difficulty concentrating, feeling tired, dizziness, headache or blurred vision.
- Loss of appetite, indigestion, feeling or being sick, diarrhoea, tummy pain or dry mouth.
- Low blood pressure (you may feel faint) or changes in heart rhythm.
- Chest tightness or thickening of the phlegm.
- Skin peeling, itchy rash and sensitivity to the sun.
- Ringing in the ears.
- Twitching, muscular weakness and abnormal co-ordination.
- Confusion, excitability, irritability, low mood or nightmares.
- Children may become excited.

Reporting of side effects:
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.
By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store CHLORPHENAMINE Tablets:
Do not use the medicine after the expiry date and if the "expiry date" on the label has passed, take the medicine back to the pharmacist.
Always keep your medicine in a safe place out of the sight and reach of children.

6. Storage:
Store in cool dry place. Keep below 25°C. Protect from direct sunlight and humidity. Keep out of the reach of children.

7. Presentation:
1x10, 2x10, 3x10, 10x10 blisters of 10 tablets in 1 carton and 100x10-100 blisters of 10 tablets in 1 carton. For HDPE containers 100/500/1000 tablets in 1 jar.



Paroela 726, Avenida das Industrias, Machava Maputo-Mozambique

STR/M/PI/009

177 x 240mm

Back

Clorfenamina comprimidos BP 4mg

Composição: Cada comprimido não revestido contém: Clorfenamina maleato BP 4 mg Excipientes q.s.

Leia este folheto antes de tomar este medicamento, pois contém informações importantes para si.

Tome este medicamento exatamente como descrito neste folheto ou como seu médico ou enfermeiro farmacêutico lhe disse.

- ConsERVE este folheto você.
- Pergunte ao seu farmacêutico se precisar de mais informações ou conselhos.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro, ou Você deve consultar o seu médico se você não se sentir melhor se você se sente pior.

Que tem neste folheto:

- O que são os comprimidos de Clorfenamina e para que são usados
- O que você precisa saber antes de tomar Clorfenamina comprimidos
- Como tomar Clorfenamina comprimidos
- Possíveis efeitos colaterais
- Como armazenar Clorfenamina comprimidos
- Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que são os comprimidos de Clorfenamina e para que são usados:
Clorfenamina pertence um grupo de medicamentos chamados anti-histaminicos. A histamina é uma das substâncias químicas liberadas nas obras Clorfenamina, bloqueando a ação da histamina.

Clorfenamina é usado para aliviar os sintomas de condições alérgicas como a febre dos fenos (rinite alérgica sazonal), corrimento nasal (rinite), urticária (também conhecido como "colmeias"), prurido (prurido), picada de insecto ou reacções picada, alergia a alimentos ou medicamentos.

Ele ajuda a aliviar os sintomas associados com as condições acima mencionadas, tais como as erupções cutâneas coceira; espirros; comichão no nariz, corrimento nasal ou bloqueado; vermelhos, coceira e lacrimejamento.

2. O que você precisa saber antes de tomar Clorfenamina Tablets:
Se a resposta a qualquer das seguintes perguntas é SIM, Não tomar este medicamento sem consultar o seu médico:

- Você já sofreu anteriormente uma reacção alérgica a um medicamento que contenha Clorfenamina ou a qualquer dos outros componentes deste medicamento (ver secção 6).
- Você já tomou um medicamento chamado de monoamina oxidase Inhibitor (MAOI) no tratamento da depressão nos últimos 14 dias?

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar comprimidos Clorfenamina se algum dos seguintes se aplicam a você:

- A pressão arterial muito alta.
- Epilepsia.
- doença cardíaca, doença hepática ou doença renal.
- Glaucoma.
- hipertrofia prostática.
- Bronquite, asma ou bronquiectasia.

Fale com o seu médico antes de tomar este medicamento se estiver a tomar outros medicamentos contendo outro anti-histaminico, incluindo produtos para o alívio de resfriados e tosses.

Outro grupo de paciente:
As crianças e os idosos são mais susceptíveis aos efeitos anticolinérgicos neurológicos da Clorfenamina.
Este medicamento não é adequado para qual quer criança até 6 anos.
Outros medicamentos e comprimidos Clorfenamina
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos. Em particular, qualquer um dos seguintes:

- Os medicamentos que têm um efeitos aditivo (por exemplo, drogas para ajudar problemas de sono ou ansiedade como eles são susceptíveis de aumentar os efeitos sedativos do Clorfenamina como Mono Amine-oxidase (MAOI).
- Os efeitos de fenitoína (um medicamento utilizado para tratar epilepsia) pode ser aumentada quando tomado com Clorfenamina.

A gravidez e o aleitamento:
Se estiver grávida ou a amamentar, pensa que pode estar grávida ou está planejando ter um bebê, perguntar ao seu médico ou farmacêutico antes de tomareste medicamento.

Aviso:
Não dirigir ou operar máquinas se os comprimidos fazem você se sentir sonolência, tonturas ou se tiver visão turva.

3. Como tomar Clorfenamina comprimidos
Consulte um médico antes de usar. Para uso oral. Os comprimidos devem ser engolidos com um copo de água. Você deve tomar o medicamento conforme indicado pelo seu médico. etiqueta do farmacêutico deve dizer-lhe o quanto a tomar e quantas vezes.
Se isso não acontecer ou se você não tem certeza pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
As doses habituais são as seguintes:
Adultos e idosos: Um comprimido (4 mg) a cada quatro a seis horas (máximo de 6 comprimido spordia).
Crianças e adolescentes
As crianças de 6-12 anos de idade: A metade de um comprimido (2 mg) a cada quatro a seis horas (máximo de 3 comprimidos por dia).
Não recomendado para crianças com menos de 6 anos de idade.
A dose prescrita pelo seu médico pode ser diferente da dose usual dada acima; siga sempre as instruções do seu médico ou farmacêutico para tomar medicamentos.
Se tiver tomado mais do que deveria:
Se você ou alguém tomou muitos comprimidos, deve contactar o seu médico ou hospital mais próximo imediatamente. Não tente dirigir. Os sintomas em crianças incluem alucinações, excitação e convulsões. Nos adultos os sintomas incluem sonolência, coma e convulsões.
Se esquecer de tomar uma dose de Clorfenamina comprimidos
Não tome uma dose dupla para compensar doses individuais e esquecidas.

4. Possíveis efeitos colaterais
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora não em todas as pessoas. As crianças e os idosos são mais propensos a efeitos colaterais.

- Os efeitos colaterais mais comuns é a sonolência. Isso pode ser útil se os sintomas são particularmente noite problemático.

Para de tomar este produto e consulte o seu médico caso:

- Experimente reacções alérgicas que podem ser graves. Os sinais incluem levantada e prurido cutâneo inchaço da face ou da boca, causando dificuldades de respiração.
- Experimente problemas de fígado.
- Experimente anemia ou hemorragia inexplicada ou contusão.
- Experimente dificuldade de água que passa.
- Colapso.

Os seguintes efeitos secundários podem ocorrer:

- Dificuldade de concentração, sensação de cansaço, tonturas, dor de cabeça ou visão embaçada.
- Perda de apetite, indigestão, sensação de enjoo ou vômitos, diarreia, dor de barriga ou boca seca.
- pressão arterial baixa (você pode sentir fraco) ou alterações no ritmo cardíaco.
- aperto no peito ou espessamento do muco.
- descamação da pele, comichão e sensibilidade ao sol.
- Zumbido nos ouvidos.
- Espasmos, fraqueza muscular e coordenação anormal.
- Confusão, excitabilidade, irritabilidade, mau humor ou pesadelos.
- As crianças podem tornar-se agitadas.

Relatórios de efeitos colaterais:
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isto inclui quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto.
Ao relatar efeitos secundários que podem ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança do medicamento.

5. Como conservar Clorfenamina comprimidos
Não utilize o medicamento após a data de validade e se o "prazo de validade" no rótulo passou, tomar o remédio de volta para o farmacêutico.
Sempre mantenha o seu medicamento num local seguro e fora da vista e do alcance das crianças.

6. Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco. Mantenha abaixo de 25°C. Proteger da luz solar direta e da humidade. Manter fora do alcance das crianças.

7. Apresentação
1x10, 2x10, 3x10, 10x10 10 blisters de 10 comprimidos em 1 caixa e 100x10-100 blisters de 10 comprimidos em caixa. Frasco de HDPE com 100/500/1000 comprimidos em 1 frasco.



Paroela 726, Avenida das Industrias, Machava Maputo-Mozambique

STR/M/PI/009

177 x 240mm

ARTWORK DETAIL LABEL

Product	Chlorphenamine Tablets BP 4mg		
Buyer / Country	Mozambique	Component	Leaflet
Dimension	177 x 240mm	Pack	NA
New Item Code	STR/M/PI/009	Old Item code	NA
Colour Shades	██████ BLACK	No. of Colours	1

Change Control No.					Artwork Version	R0
Design/Style	Front & Back Printing					
Substrate	60 gsm maplitho paper					
Special Instruction	Colours to be matched as per pantone shades only. Printing clarity to be clear and sharp					
Autocartoner Requirement	NA					
Prepared By:	Reviewed By:	Reviewed By:	Reviewed By:	Approved By:		
PDC-AW	Mkt/BD	RAD	PD	QA		

FOR ARTWORK REVISION PURPOSE

To be filled by SCM (Planning)	Effective Date :		Sign/ Date:	
Caution to the printer: Before processing please ensure that the ARTWORK received for printing is exactly in line with APPROVED ARTWORK provided to you. In case of any FONTS/DESIGN are Mis - matching with the APPROVED ARTWORK, please inform to PDC for further action. DO NOT MAKE ANY CHANGE TO THE ARTWORK WITHOUT WRITTEN INSTRUCTION FROM PDC.				

QA/068/F-01/R0