

## **GENMOX-S 250**

Amoxicilina para suspensão oral

### **APRESENTAÇÃO:**

Suspensão Oral Frasco pronto a dispensar contendo pó branco ou amarelo claro para preparação de suspensão amarela com sabor frutado em embalagens de 60 ml (ou 100 ml).

### **COMPOSIÇÃO:**

Cada 5 ml de suspensão reconstituída contém: Amoxicilina Tri-hidratada equivalente a Amoxicilina anidra 125 mg ou 250 mg.

### **PROPRIEDADES:**

A amoxicilina é bactericida e tem uma actividade de amplo espectro que é eficaz contra organismos gram-positivos e negativos. Incluindo estreptococos hemolíticos, Diplococcus pneumotia, estafilococos não produtores de penicilinase, Bacillus anthracis, Clostridia spp. Corynebacterium xerose e a maioria das cepas de Enterococci, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, N, meningite, Proteus mirabilis muitas cepas de Salmonella e Escherichia coli. É menos eficaz do que a Ampicilina contra Shigella spp. e mais eficaz contra estreptococos e Salmonella spp.

### **INDICAÇÕES:**

A amoxicilina é indicada no tratamento de: Infecções de ouvido e garganta causadas por Streptococcus, Pneumococci, Staphylococcus não produtores de penicilinase e Haemophilus influenza. Infecções do trato geniturinário causadas por Escherichia Coli, Proteus Mirabilis, Steptococcus faccalis. Staphylococcus e Ecoli não produtores de penicilinase. Gonorrhoea anogenital e uretral aguda não complicada em machos e fêmeas causada por N.Gonorrhoea.

## **DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO:**

Instruções para Misturar Suspensão Oral

Bata no frasco até que todo o pó flua livremente. Adicione aproximadamente 1/3 da quantidade total de água para reconstituição e agite vigorosamente para molhar o pó.

Em seguida, adicione água à balança e agite novamente vigorosamente.

A amoxicilina é estável na presença de ácido gástrico e pode ser administrada antes ou depois das refeições.

Adultos crianças com peso corporal igual ou superior a 20 kg: 250-500 mg a cada 8 horas até um máximo de 4,5 g por dia.

Lactentes até 6 kg de peso corporal: 25-50 mg a cada 8 horas.

Bebés de 6 a 8 kg de peso corporal: 50 a 100 min a cada 8 horas.

Lactentes e crianças 8-20 kg de peso corporal: 6,7-13,3 mg/kg de peso corporal.

Gonorréia: 3 g em dose única com 1 g de probencid.

O tratamento deve ser continuado por no mínimo 48-72 horas após o paciente se tornar assintomático ou evidência de erradicação bacteriana ter sido obtida.

## **CONTRA-INDICAÇÕES:**

A amoxicilina é contraindicada em pacientes alérgicos a penicilinas e em pacientes com mononucleose infecciosa.

## **PRECAUÇÃO:**

A suspensão não pode ser tomada pelo paciente de diabetes.

Pacientes com insuficiência renal podem necessitar de doses menores. Evite o uso prolongado, pois pode levar ao supercrescimento de organismos não susceptíveis. Como com qualquer outra droga potente, o monitoramento das funções renal, hepática e hematopoiética deve ser

realizado durante a terapia prolongada. Reacções anafiláticas graves e ocasionalmente fatais podem ocorrer em pacientes com histórico de alergia a múltiplos alérgenos. A segurança de Amoxicilina durante a gravidez não foi estabelecida.

### **EFEITOS COLATERAIS:**

Assim como com outras penicilinas, podem ocorrer as seguintes reacções adversas: Reacções de hipersensibilidade - erupções maculopapulares eritematosas e urticária que podem ser controladas com anti-histamínicos e, se necessário, corticosteróides sistêmicos. Se ocorrerem reacções de hipersensibilidade, o tratamento deve ser descontinuado. Gastrointestinal-Náuseas, vômitos e diarreia. Fígado-Foi observado um aumento moderado na concentração sérica de AST (SGOT), mas o significado deste achado é desconhecido. Blood Dysceasia-Eosinophilis hemolytic anemia, anemia, leucopenia, neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia, púrpura trombocitopênica e infecções agudas foram relatadas durante a terapia com penicilinas. Estas reacções são geralmente reversíveis com a descontinuação da terapia e acredita-se que sejam fenómenos de hipercisividade.

### **SINTOMAS E TRATAMENTO DA SUPERDOSAGEM:**

A amoxicilina é virtualmente não tóxica para o homem. Doses excessivas podem ter efeitos irritantes no trato gastrointestinal, causando náuseas com ou sem vômitos e diarreia leve a grave. Não há antídoto específico. Deve ser administrado tratamento sintomático.

**VIDA ÚTIL:** Quatro anos.

### **ARMAZENAR:**

Proteger da luz. Não armazene acima de 30 °C

A suspensão oral preparada com adição de água deve ser armazenada em temperatura ambiente não superior a 30°C e consumida em até 7 dias, ou em refrigeração consumida em até 14 dias.

## **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS**

### **Fabricado por:**

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1, Ruiyang Road, Yiyuan County, Shandong Province, China.

### **Distribuído por:**

Generics & Specialities Lda

Moçambique.

**generics**